

Generell beskrivelse

Kvartærgeologien omhandler den yngste perioden av Jordens historie — kvartæren. Denne er preget av store klimaavvinginger med istider og varmere mellomistider. Levehistorie, slik de oppstår i Norge i dag, ble for det meste dannet under og etter siste istid. Is og vann førte store mengder løsmasser ut på kontinentalsokkelen og til våre rabbløst Jordkorpora var sterkt nedpresset av isrykket, men senere er klasteakkumulert ved i stedet har havet økt i forhold til havnivået, med til andre strek, mindre i høyden. Landhevingen har ført til at store arealer med gammel hav- og fjordbunn i dag er tørr land. De største klasteakkumuleringer av mektige løsmasser er knyttet til disse arealene. Løsen til de senere og en del tidligere istid i fjordene, hvor de store arealene, dens avsetning og smeltevannets virksomhet resulterte i en rekke forskjellige løsmasse-typer og karakteristiske landformer. Senere har prosesser som forvining, torv- og myrdommer, elveerosjon og ras bidratt til å gi landskapet den form det har i dag.

Kvartærgeologiske kart viser løsmassenes utbredelse og egenskaper. De gir også opplysninger om dannelsesmåte, overflateformer, kvartærgeologiske bevegelsesretninger og avsetningsforhold. Kartet fremstiller forholdene nær markoverflaten. Mektighet og lagfølge er angitt hvor data foreligger. For sorterte avsetninger som leire, breelvsavsetninger, elveavsetninger og vindavsetninger, blir komsterrelse angitt.

Løsmassenes inndeling bygger på deres dannelsesmåte:

Morenemateriale er løsmasser avsatt direkte av isbreer. Det dannes et mer eller mindre sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre løsmasse typer ligger ofte på et underlag av morenemateriale. Morenematerialet består oftest av alle komsterrelser fra blokk til leir, men mengden av ulike komsterrelser kan variere. Bergartefragmenter i materialet er oftest relativt små. På og nær markoverflaten er det ofte regelbrette og meningsfulle høyere enn mot dypt. Særlig i blokkrike arealer er angitt. Usortert materiale fra mektige moreneavsetninger er svært vanskelig å avgrense fra morenemateriale forøvrig, og er derfor ikke skilt ut fra dette.

Morenematerialet er inndelt på grunnlag av utbredelse og mektighet:

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedsvis med stor mektighet brukes for arealer med til eller ingen fjellbølninger. Berggrunnen ansløres tre like tydelig fram på grunn av morenemektigheten som varierer fra tre en halv til noen få meter. Lokalt kan mindre mektigheten være langt større.

Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen brukes for arealer hvor mektigheten er liten. Berggrunnen småformer tre tydelig fram, og som regel finnes mektige små fjellbølninger. I enkelte mindre berggrunnspartier kan mektigheten være mer enn en halv meter.

Moreneleire er morenemateriale hvor leirinnholdet er betydelig høyere enn vanlig. Den har ofte mer gråblå farge, og er i løst tilstand meget hard (vårskellig gravbar). Ved opptøining blir den svært for grøne våkkløper, leire, i brukte våkkløper.

Ablassjonsmorene er morenemateriale transportert i eller på breen og avsatt over andre avsetninger eller direkte over fjell på innlandslens smalt brett. Ablassjonsmorenen er løst pakket og består ofte av grus- og steinmengder med lite eller ingen leire. Partier av lagdel og sortert materiale kan forekomme. Overflaten er ofte haugel eller småkupert med høyt innhold av blokker. Ablassjonsmorenen opptrer oftest i lørringforstrekninger og delingslinjer.

Randmorene brukes som betegnelse på ryggformete strandavsetninger (randmorener og sidemorener) dannet ved brestanset og korvante stopp under isavsmeltning. Avsetningen består vesentlig av morenemateriale, men stedsvis kan det oppetre partier med sortert materiale. Kornsterrelsen i randmorener varierer meget.

Breelvsavsetninger (Glasiakviline avsetninger) er løsmasser avsatt av strømmende smeltevann fra isbreer. De kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert etter komsterrelsen. Sand og grus er oftest de dominerende komsterrelser. Stein- og grusfraksjonen er som regel rundet.

Ryggformet breelvsavsetning (Esker) er dannet av breelver i sprekker eller tunneler i stagnerende breer. Ryggene kan ha en hud av ablassjonsmorene.

Haugformet breelvsavsetning (Kame) brukes for isolerte hauger dannet i sprekker eller huller i istagnerende breer.

Brestelvsavsetninger (Glasiakviline avsetninger) er løsmasser avsatt ved relativt rolige strømningsforhold i bredene i esker. De kjennetegnes ved nær horisontal lagdeling, og oftest av innlagt og lite strømmende eller stillestående vann.

Innsjøavsetninger (Lakustrine avsetninger) har mange felles trekk med breelvsavsetninger, men inneholder ofte organisk materiale. På grunn av sløvt landheving, elveerosjon i domene løsmasser eller regulering kan de finnes over dagens sjønivå.

Hav- og fjordavsetninger (Marine avsetninger) sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet, er løsmasser bunnfyllt i havet. På grunn av landheving finnes disse avsetningene ofte høyt over dagens havnivå. Silt og leir er oftest de dominerende komsterrelser i mange områder hvor det gitt lavest. Tydelige dekket er vist på kartet. Utsatte løsmasser er ikke skilt ut fra utstrøpte hav- og fjordavsetninger.

Strandavsetninger (Marine strandavsetninger), sammenhengende dekke, er materiale utvasket ved bølge- og strømaktivitet i strandsonen. Det ligger oftest som et dekke over andre løsmasser, men forekommer også direkte på fjell. Kornsterrelse og sortering kan variere meget.

Hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen, brukes for arealer hvor begge disse avsetningstypene forekommer. Mektigheten varierer sterkt, men er gjennomgående liten. Som regel finnes littrike fjellbølninger. Komsterrelsen varierer fra leire til grov grusstein.

Elve- og bekkeavsetninger (Fluviatile avsetninger) er dannet etter tiden ved at strømmende vann har gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange felles trekk med breelvsavsetningene, men de er som regel bedre sortert.

Vindavsetninger (Eoliske avsetninger) består av vindblåst materiale. Den dominerende komsterrelsen er fin sand.

Forviningmateriale er dannet ved mekanisk eller kjemisk nedbryting av det faste fjell. Materialet kjennetegnes ved at fragmentene er sharpkantede, og ved en gradvis overgang fra løsmasser til fjell. Kan bergarter fra den underliggende berggrunnen finnes i løsmassene. Komsterrelsen varierer sterkt.

Forviningmateriale, blokkhav, er brukt om områder dekket av høstapenete blokker.

Forviningmateriale, sammenhengende dekke brukes for arealer med til eller ingen fjellbølninger. Mektigheten er vanligvis fra en halv til et par meter. Enkelte steder kan mektigheten være større.

Forviningmateriale, usammenhengende eller tynt dekke brukes for arealer hvor mektigheten er liten. Ofte forekommer små fjellbølninger. Enkelte steder kan mektigheten være mer enn en halv meter.

Ur (Talus) er brukt som fellesbetegnelse for avsetninger dannet ved steinras.

Steinmateriale, vekselende mektighet, er brukt om materiale i bratte dal- eller fjelldaler og består av en blanding av nedlagt forviningmateriale og morenemateriale med innslag av ur og organisk materiale. Mektigheten er ofte liten, men tiltar gjerne ned mot de lavestliggende deler av skråningen. Særlig mektig er steinbrennere som trange gull og sluker i dalstid hvor snøskred og fomedrå bidrar til dannelsen.

Torv- og myrdommer (Organisk materiale) er brukt som fellesbetegnelse for forekomster av torv, og og gyte med mektighet større enn ca. 0,3 m.

Humusdekket foretrekker over berggrunnen omfattende områder dekket av humus eller tynt løvsavsetninger. Mektigheten er vanligvis ca. 0,1 — 0,3 m, men i enkelte områder kan et råhumusdekk ha litt større mektighet.

Tynt eller usammenhengende løsmassedecke over berggrunnen, flere løsmasser — her lutt vekselig brukes om områder hvor tre eller flere avsetningstyper velles så at de er umulig å skille ut på kartet, samtidig som ingen av dem dominerer. Mektigheten er generell liten, og fjellbølninger er vanlige. Oftest innrull: morenemateriale, hav- og fjordavsetninger, strandavsetninger, forviningmateriale, ur og humusdekk over fjell. Fylmasser er løsmasser tilført av mennesker. Betegnelsen er brukt for stovtøper, oppfyllinger og andre større fyllinger. Bakkeplanering i jordbruksområder er ikke inkludert.

Små eller vanskelig avgrensbare avsetninger i områder dominert av andre løsmasser/bart fjell angis ved hjelp av bokstavsymboler. I områder med løsmasser brukes symbolene for avsetninger i overflaten som har for liten mektighet eller er for små til å de kan skilles ut med egen farge, og for avsetninger som er innblendet i den dominerende løsmasseleiren. I områder med bart fjell brukes symbolene for løsmasser i sprekker og små forstrekninger. Avsetningene har for liten mektighet eller er for små til å de kan skilles ut med egen farge.

Supplerende undersøkelser av løsmassene
Prøvetaking av løsmasser er foretatt for å kunne bestemme nærmere løsmassenes sammensetning og egenskaper. Prøvetakingsstedene er avmerket på kartet og angir hvilke laboratoriemål som er tatt som f.eks. kornfordeling, sprøhet og flegheit, betongprøvetesting.

Boringer og seismiske undersøkelser er foretatt for å vurdere løsmassenes mektighet og utbredelse. Særlig gir disse metodene informasjon om de enkelte lags bøkkel og sammensetning.


Noen eksempler på bruk av kartet
Arbeidsplanering og ressurtforvaltning
Kvartærgeologiske kart (og andre temakart er et nødvendig hjelpemiddel for å oppnå formelig forvaltning og utnyttning av våre naturressuser. Løsmassene er grunnlaget for plante- og dyreliv og dermed for landbruk og beotting. Disponering av arealer til landbruk, boligbygging, industri, kommunikasjonsnett, resipient og søppelplasser er alle eksempler på utnyttelse av løsmassene. I tillegg kommer løsmassenes kulturelle betydning (fritidsliv, natuvern, undervisning og forskning).

Dyringsjord er knyttet til hav- og fjordavsetninger, elveavsetninger, og andre sorterte avsetninger, samt områder med sammenhengende dekke av morenemateriale. Myr kan være god dyringsjord, særlig hvis den ligger over løsmasser. Også forviningmateriale kan være egnet for dyrking i spesielle tilfeller.

Sand- og grusressursene er knyttet til breelvs- og elveavsetningene. I disse avsetningene finnes de fleste av de største utvaskte grus- og sandkornstørrelsene. De kan også benyttes som resipient for forurenset avløpsvann. Strandavsetninger kan i enkelte områder være en grusressurs.

I utbyggingsområder vil kartet brukes på et tidlig stadium i prosjekteringen og grunnleggende opplysninger om grunnforholdene og kunne begrense omfang av kostbare spesialundersøkelser.

* Finnes ikke på dette kartet.



Tegnforklaring

Løsmasser

- Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedsvis med stor mektighet
- Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen
- Breelvsavsetninger (Glasiakviline avsetninger)
- Ryggformet breelvsavsetning (Esker)
- Elve- og bekkeavsetninger (Fluviatile avsetninger)
- Vindavsetninger (Eoliske avsetninger)
- Ur (Talus)
- Torv- og myrdommer

Bart fjell

- Bart fjell
- Liten fjellbølning

Små eller vanskelig avgrensbare avsetninger i områder dominert av andre løsmasser/bart fjell

- M - Morenemateriale
- B - Breelvsavsetninger
- E - Elve- og bekkeavsetninger
- V - Vindavsetninger
- R - Ur
- T - Torv- og myrdommer
- Z - Fylmasser

Kornsterrelse

○	Blokk	Større enn 256 mm	Kartet fremstiller den (de) dominerende kornsterrelse- fraksjon(er).
○ ○ ○	Stein	256 mm - 64 mm	
● ● ●	Grus	64 mm - 2 mm	
○ ○ ○ ○	Sand	2 mm - 0,063 mm	
○ ○ ○ ○ ○	Silt	0,063 mm - 0,002 mm	
○ ○ ○ ○ ○ ○	Leir	Minstre enn 0,002 mm	

Løsmassenes mektighet og lagfølge

(L = Bløtt, S = Sand, G = Grus, 3 = Sand, 4 = Silt, I = Leir, E = Fjell, M = Morenemateriale, B = Breelvsavsetning, I = Elve- og bekkeavsetning)

Den kartlagte avsetning er 3 m mektig
Den kartlagte avsetning er mektigere enn 2 m
Den kartlagte avsetning er 1 m mektig, under er det 3 m grus over fjell
Mektigheten er sådant til mer enn 5 m

Særtrakk i løsmassenes overflate

- Horisontalekket i overflaten
- Stein- eller blokkhav

Isbøvelgesetning

Isbøvelgesetning, benyttet med observasjonspunktet
Krysset indikeringsposisjon, antall haker viser med økende relativt alder.

Overflateformer

- Smeltevannsløp i løsmasser
- Smeltevannsløp i fjell (Gyl)
- Skar døringsrop
- Liten døringsrop
- Iskantutbølning
- Elve- eller bekkeutbølning
- Tidligere elve- eller bekkeløp
- Flombjøp
- Viftomst
- Stovtøper
- Ravine
- Liten ryggstygge
- Markert haug- eller ryggform
- Haug- og ryggformet overflate
- Rygd i løsmasser

Andre symboler

- Massestak i løst
- Massestak, nedlagt eller i sporadisk drift

Supplerende undersøkelser av løsmassene

- Boring
- Seismisk profil med referanse

Prøvetakingssteder:

- Kornfordeling
- Sprøhet og flegheit
- Betongprøvetesting
- Petrografiske/geokjemiske analyser

Opplysninger fås ved: Næringsmiddelkontroll og sikkerhetskontroll, Postboks 3506, 7001 Trondheim, Lokalisering ved NGU's UTM-kartnett i kartbildestrukturen.

Kartlagt i 1978-79 av Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Fylkeskartene i Hedmark, Follafjordene, utført av T. Bergel, D. Riee, A. Håstad, J. Høe, K. Oklad, A. Rasmussen, H. Svein og E. Sørensen. Ansvaret for kartlegging og sammestelling: Terje H. Bergel.

Referanse til dette kartet: BRAGEGEL T. H. — 1981 JØMNA. Kvartærgeologisk kart CWX 065 066, M. 1:20.000. Norges geologiske undersøkelse.

KARTBLADINDELING

2016 IV 2016 I

2016 III 2016 II

2016 V

Kvartærgeologiske kart utgitt i M. 1:20.000 i årrykning til NGU's kvartærgeologiske kartlegging M. 1:50.000.

Kartbladindeling i NGU's serie M711

Plattlagt utgitt i M. 1:20.000, fotokopier kan leveres

Kartgrunnlag: Det økonomiske kartverk. Topografisk. Norges geologiske undersøkelse. Aag. Bjørntun Tryksen, Trondheim — 1981

